

# 선형대수

2014년 1학기

## 기말고사

서울시립대학교  
컴퓨터과학부

### 주의사항

- 시험지는 앞/뒤로 인쇄되어 있으니 유의하시기 바랍니다.
- 만점은 100 점입니다.
- 부정행위가 발각되면 즉시 시험지가 압수되고 0점 처리 됩니다.
- 처음부터 모든 문제를 풀지 말고, 문제를 모두 훑어본 후 풀 수 있다고 생각되는 문제부터 풀 것을 권장합니다.
- 교재에 있는 theorem을 이용할 경우, 해당 theorem을 증명할 필요 없이 어떤 theorem 인지를 밝히고 이용하여도 좋습니다.
- 강의시간에 배운 범위안의 내용에만 근거해서 답변해야 합니다. 예를 들어, 아직 배우지 않은 내용을 근거로 답하는 경우, 맞더라도 감점이 됩니다.

1. 10점  $n \times n$  matrix  $A$ 의 eigenvalue가 (중복을 고려하였을 때) 다음과 같다고 하자.

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{n-1}, \lambda_n.$$

Real number  $c$ 에 대해, 다음 matrix의 eigenvalue를 모두 구하라. ( $I$ 는 identity matrix이다.)

$$A + cI$$

**Solution:** The characteristic equation of  $A + cI$  is

$$\det A + cI - \mu I = \det A - (\mu - c)I = 0.$$

Since  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  are the roots of the characteristic polynomial

$$\det A - \lambda I = 0,$$

the eigenvalues of  $A + cI$  are

$$\mu_i = \lambda_i + c, \quad i = 1, \dots, n.$$

2. 20점 다음과 같이 column vector  $\mathbf{u}$ 와  $\mathbf{v}$ 가 정의되어 있다.

$$\mathbf{u} := \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v} := \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

또한  $3 \times 3$  matrix  $A$ 가 다음과 같이 정의되어 있다.

$$A := \mathbf{u}\mathbf{v}^T$$

### Hint

3번 문제가 본 문제를 generalization한 것이다. 3번 문제의 Hint도 도움이 될 수 있다.

- (a) 10점  $A$ 의 eigenvalue를 (중복 회수를 포함하여) 모두 구하고, 각 eigenvalue의 eigenspace를 각각 구하라.

**Hint** 이 문제는 복잡한 계산을 거쳐서 풀 수도 있지만, 다음을 근거로 하여 eigenvector와 eigenvalue를 쉽게 찾을 수 있다.

Nonzero vector  $\mathbf{x}$ 가  $A$ 의 eigenvector이면, 다음 중 하나가 성립한다.

- $A\mathbf{x}$ 와  $\mathbf{x}$ 가 parallel하다. (방향이 바뀌지 않는다.)
- $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 이다. 이 때 eigenvalue는 0이다.

- (b) 10점  $A$ 의 singular value를 모두 구하라. (중복되는 경우 중복된 회수도 명시하라.)

**Hint**  $A^T A$ 가 어떤 matrix인가 (혹은 어떤 matrix와 비슷한가) 살펴보라. 위 Hint를 근거로  $A^T A$ 의 eigenvalue 및 eigenvector를 쉽게 구할 수 있을 것이다.

### Solution:

- (a) 모든  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ 에 대해,

$$A\mathbf{x} = \mathbf{u}\mathbf{v}^T \mathbf{x} = \mathbf{u}(\mathbf{v} \cdot \mathbf{x})$$

이다. 따라서

- (i)  $\mathbf{x} = \mathbf{u}$ 이면  $A\mathbf{u} = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{u}$ 이므로 eigenvalue  $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ 를 갖고,
- (ii)  $\mathbf{v} \cdot \mathbf{x} = 0$ 이면 eigenvalue 0을 갖는다.

각각을 고려해 보자.

- (i) Eigenvalue  $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ 의 경우, 위 관계에 의해

$$E_{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}} = \text{span}(\mathbf{u}).$$

- (ii) Eigenvalue 0의 경우,  $\mathbf{v}$ 에 orthogonal한 모든 vector가 eigenvector가 된다. 따라서

$$E_0 = (\text{span}(\mathbf{v}))^\perp.$$

$E_0$ 의 basis를 구하려면 아래 homogeneous linear system을 풀면 된다.

$$Ax = \mathbf{0}.$$

좀 더 간단하게 구하기 위해서는,  $\mathbf{v}$ 에 orthogonal하고 서로 parallel하지 않은 두 vector를 구하면 된다. 예를 들면 아래 두 vector가 이에 해당된다.

$$E_0 = \text{span} \left( \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right).$$

(b)

$$A^T A = \mathbf{v} \mathbf{u}^T \mathbf{u} \mathbf{v}^T = \mathbf{v} (\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}) \mathbf{v}^T = \|\mathbf{u}\|^2 (\mathbf{v} \mathbf{v}^T)$$

이때  $\mathbf{y} := \mathbf{v} / \|\mathbf{v}\|$ 라고 하면 (즉,  $\mathbf{v}$ 를 normalization한 vector를  $\mathbf{y}$ 라고 하면)

$$A^T A = \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 (\mathbf{y} \mathbf{y}^T)$$

위에서  $P := \mathbf{y} \mathbf{y}^T$ 라고 하자. 이 때  $P$ 는 임의의 vector를  $\mathbf{y}$ 에 projection하는 matrix를 나타낸다. 따라서  $P$ 의 eigenvalue는 1과 0이고, 따라서  $A^T A$ 의 eigenvalue는  $\|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2$ 과 0이다. 따라서  $A$ 의 singular value는

$$\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| = \sqrt{14} \sqrt{6} = 2\sqrt{21}, 0, 0$$

이다.

3. 30점 위 문제를 임의의 dimension으로 generalization하여 보자. 즉, 서로 parallel하지 않은 두 vector

$$\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$$

에 의해  $n \times n$  matrix  $A$ 가 다음과 같이 정의되었다.

$$A := \mathbf{u}\mathbf{v}^T.$$

이 때 다음을 각각 구하라.

- (a) 10점  $A$ 의 eigenvalue를 (중복 회수를 포함하여) 모두 구하고, 각 eigenvalue의 eigenspace를 각각 구하라. (Eigenspace의 basis를 구하기 힘든 경우, basis를 구할 필요는 없고 구체적으로 어떠한 subspace인지를 기술하라.)

**Hint** Orthogonal complement의 개념을 활용하라.

- (b) 10점  $A$ 는 diagonalizable한가? 구체적인 이유를 기술하라.

**Hint** Orthogonal complement의 dimension 성질을 활용하라.

- (c) 10점  $A$ 의 singular value를 모두 구하라. (중복되는 경우 중복된 회수도 명시하라.)

**Solution:**

- (a) By the discussion of the previous question, we have two eigenvalues  $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$  (multiplicity 1) and 0 (multiplicity  $n - 1$ ). The eigenspaces are

$$E_{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}} = \text{span}(\mathbf{u})$$

and

$$E_0 = (\text{span}(\mathbf{v}))^\perp.$$

- (b) In the previous part, the geometric multiplicity of the eigenvalue  $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$  is 1. Let

$$W := \text{span}(\mathbf{v}).$$

then, since

$$\dim W + \dim W^\perp = n,$$

the geometric multiplicity of the eigenvalue  $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ ,  $\dim W^\perp$ , is  $n - 1$ . Since the geometric multiplicities of all the eigenvalues are the same with their algebraic multiplicities,  $A$  is diagonalizable.

- (c) By the discussion of the previous question, the singular values of  $A$  are  $\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|$  (multiplicity 1) and 0 (multiplicity  $n - 1$ ).

4. **20점** 다음 문장이 맞는지 틀린지 답하고, 본인의 답을 증명하라. (답이 맞더라도 증명을 하지 않거나 틀리면 많은 감점이 됨)

“임의의 square matrix  $A$ 에 대해,  $\text{rank}(A)$ 는  $A$ 의 nonzero eigenvalue의 수와 같다.”

**Hint**  $\text{rank}(A^T A)$ 와  $\text{rank}(A)$ 의 관계 및 similar한 두 matrices의 rank 관계를 활용하라.

**Solution:** No. Here's a counter example:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$A$ 의 eigenvalues는 0 (multiplicity 2)이므로 nonzero eigenvalue의 수는 0이다. 하지만  $\text{rank}(A) = 1$ 이다. ( $A$ 는 이미 row echelon form이므로  $\text{rank}(A)$ 는  $A$ 의 nonzero row의 수와 같다.)

5. 20점 Real symmetric matrix의 경우, SVD (singular value decomposition) 한 결과가 diagonalization한 결과와 같음을 보여라. 즉, Real symmetric matrix  $A$ 의 경우 다음과 같이 SVD하였을때와

$$A = U\Sigma V^T$$

다음과 같이 diagonalization하였을 때,

$$A = PDP^{-1}$$

다음이 성립함을 보여라.

$$U = P, \quad \Sigma = D, \quad \text{그리고} \quad V^T = P^{-1}.$$

**Solution:** Since  $A$  is real symmetric, it is orthogonally diagonalized as follows.

$$A = PDP^{-1} = PDP^T.$$

Let  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  are the eigenvalues of  $A$  with corresponding eigenvectors  $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ .

- (i) Since  $A^T A = A^2$ , the eigenvalues of  $A^T A$  are  $\lambda_1^2, \dots, \lambda_n^2$  with the same eigenvectors. Therefore the singular values of  $A$  are

$$\sigma_i = \lambda_i$$

and  $D = \Sigma$ .

- (ii) The columns of  $V$  are the eigenvectors of  $A^T A$ . Since  $A$  and  $A^T A$  share the same eigenvectors,  $V = P$ .

- (iii) Let  $U = [\mathbf{u}_1 \ \cdots \ \mathbf{u}_n]$ . Since

$$\mathbf{u}_i = \frac{1}{\sigma_i} A \mathbf{v}_i = \frac{1}{\lambda_i} \lambda_i \mathbf{v}_i = \mathbf{v}_i,$$

$$U = P.$$